

# ДИФТЕРИЯ

## Пути заражения:



- Воздушно-капельный



- Контактно-бытовой

## Симптомы:



- Повышенная температура
- Общая слабость
- Боль в горле



- Затрудненное дыхание
- Отек и характерные пленки на слизистой
- Отек шеи

## Осложнения:



- Тяжелые поражения сердца и почек
- Поражение нервной системы (параличи, парезы)



- Инфекционно-токсический шок
- Летальный исход

## Чтобы избежать заражения:

1. Пройти обследование, чтобы определить иммунитет к дифтерии
2. Делать прививки детям, согласно календарю прививок, и прививаться каждые 10 лет.



# ДИФТЕРИЯ

## СИМПТОМЫ

- Наиболее характерный симптом – серо-белые пленочные налёты на нёбе, миндалинах, задней стенке глотки.
- Боль при глотании
- Повышение температуры
- Увеличение миндалин или лимфоузлов
- Отёчность шеи
- Специфический запах изо рта



## Лечение

Антитоксическая противодифтерийная сыворотка + приём антибиотиков

## ОСЛОЖНЕНИЯ

- Инфекционно-токсический шок
- Поражение нервных окончаний
- Параличи, преимущественно нёба, голосовых связок, дыхательных путей, шеи
- Почечная недостаточность
- Сердечная недостаточность
- Летальный исход



## ПРОФИЛАКТИКА

- Прививка АКДС, АДС, АДС-М
- Детям в 2, 4, 6 месяцев, затем в 18 месяцев, в 6 и в 16 лет
- Взрослым – каждые 10 лет

# ЕСТЬ ВАКЦИНА! ДИФТЕРИЯ



Дифтерия -  
инфекционное  
заболевание  
с летальностью до

**10%**

даже в случае  
правильного лечения

Осложнения:  
асфиксия вследствие  
закрытия просвета  
дыхательных путей  
отеком  
и пленками,  
миокардит,  
полинейропатия,  
паралич, почечная  
недостаточность



Эпидемия дифтерии  
среди непривитого  
населения России  
привела к смерти

**>4000**

человек в 90-е годы  
XX века

Симптомы:  
повышение  
температуры,  
сухой кашель,  
хриплость голоса,  
боли в горле,  
образование  
пленчатых налётов на  
миндалинах и нёбе



Необходима  
ревакцинация против  
дифтерии взрослых  
каждые

**10**  
лет



Вакцинация - самая  
эффективная мера  
профилактики  
дифтерии;  
проводится  
трехкратно детям в 3,  
4,5 и 6 месяцев с  
ревакцинациями в  
18, 6-7 и 14 лет